



Dræn

Mødetidspunktdag den/..... Kl.....

Velkommen:

Velkommen til Øre- næse- halsklinikken på Rømersgade. Denne vejledning indeholder information om indgrebet, og hvad der skal ske omkring operationen.

Om indgrebet:

Anlæggelse af dræn i trommehinden vælges ved:

- Gentagne mellemørebetændelser med belastende smerter.
- Længerevarende væske i mellemøret med påvirket høreevne, tale og adfærd.

Anlæggelse af dræn bevirker bedre ventilation af mellemørerne. Slimhinden i mellemørerne vil langsomt normaliseres, således, at slimdannelse aftager. Trommehinden vil efterhånden igen kunne svinge frit, og hørelsen dermed blive normal.

Inden operationen:

Mavesækken skal være tom før bedøvelsen. Det er farligt at bedøve børn med noget som helst i mavesækken. Derfor:

Må man ikke spise de sidste 6 timer før operationen. Man må drikke vand og KUN VAND op til 2 timer før operationen.

Ammemælk må gives senest 4 timer før operationen. Astmaspray benyttes som vanligt før operation

Operationen:

Indgrebet foregår i fuld narkose givet på maske af klinikens speciallæge i anæstesiologi. Indsovningen varer under 1 min. Drænet, der er få mm langt, placeres i et lille snit i trommehinden, efter at mellemøret er suget tomt for slim.

Efter operationen:

De første dage efter operationen kan det flyde fra øret med slim, pus eller blod. Flyder det mere end 3-5 dage, kan det være hensigtsmæssigt at ringe til klinikken, idet det i så fald kan blive nødvendigt at modtage behandling med øredråber. Senere i forløbet kan det måske begynde at flyde fra øret, f.eks. i forbindelse med forkølelse. Når det skal til at flyde, kan patienten have smerter, idet der skal opnås et vist tryk bag drænet, før det begynder at flyde. Ved voldsomt øreflåd kan drænet desværre udstødes og genanlæggelse blive nødvendig.

Efterforløbet:

Efter ca. 3 uger skal barnet møde til kontrol af mellemøre og dræn. Herefter vil vi jævnligt følge ørerne (ca hver 3. Måned), indtil drænet er faldet ud af sig selv, hvilket typisk tager 6-12 måneder. Er mellemørerne herefter blevet raske, er behandlingen slut. Kommer der øreproblemer igen, kan det blive nødvendigt at lægge nye dræn.

Børn må gerne bade og svømme med dræn. Ved dykning kan der komme vand til mellemøret gennem drænet. Det kan være hensigtsmæssigt at beskytte ørene, fx med ørepropper, ved dykning i swimmingpools og svømmehal. Flyvning er uden problemer med dræn.

