



Fjernelse af polypper

Mødetidspunktdag den/..... Kl.....

Velkommen:

Velkommen til Øre- næse- halsklinikken på Rømersgade. Denne vejledning indeholder information om indgrebet, og hvad der skal ske omkring operationen.

Om indgrebet:

Polypper sidder i næsesvælget oppe bag den bløde gane. Operationen kommer på tale ved gentagne, langvarige mellemøreproblemer eller vedvarende besværet/ophævet vejrtrækning gennem næsen. De forstørrede og ofte inficerede polypper fjernes ved udskrabning gennem munden.

Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af klinikens speciallæge i anæstesiologi.

Inden operationen:

Mavesækken skal være tom før bedøvelsen. Det er farligt at bedøve børn med noget som helst i mavesækken. Derfor:

Må man ikke spise de sidste 6 timer før operationen. Man må drikke vand og KUN VAND op til 2 timer før operationen.

Ammemælk må gives senest 4 timer før operationen. Astmaspray benyttes som vanligt før operation

Inden I forlader hjemmet skal der gives smertestillende medicin: **Stikpille Panodil efter vægt.**

Operationen:

Indgrebet foregår i fuld narkose givet på maske af klinikens speciallæge i anæstesiologi. Indsovningen varer under 1 min. Der vil blive lagt en dropnål i håndryggen efter indsovningen.

Efter operationen:

Det kan forventes at barnet vil være grædende i opvågningen.

Barnet vil blive observeret i klinikken, indtil tilstanden er stabil.

Efter operationen føles drøblen ofte mere fyldig end normalt (vandig hævelse), og tungen kan føles tykkere end før (efter trykket fra mundspærre).

Efter operationen skal barnet være hjemme i 2 døgn.

Efterforløbet:

Risikoen for komplikationer er lille, men **ved større vedvarende blødning skal du ringe 112.**

Når I kommer hjem må barnet drikke og spise is, yoghurt o. lign. – senere på dagen, hvis der ikke har været problemer, må barnet spise normalt. Første døgn er det dog bedst med kold og blød kost. Ved smerter efterfølgende kan gives panodil efter vægt.

